

Climat : distinguer le vrai du faux



Au fur et à mesure que s'accumulent les signaux montrant l'ampleur de la catastrophe climatique, l'attitude de déni de cette réalité et la montée des arguments climatosceptiques prennent plus de place et apparaissent comme une porte de sortie confortable. Le président Donald Trump en joue et a pu convaincre les États-Uniens de sortir de l'accord de Paris. Il s'avère nécessaire de reprendre l'ensemble des objections les plus courantes et de les passer sous les fourches caudines de la connaissance scientifique. Un exercice auquel

Progressistes vous invite à travers cet article – paru en 2018 sur le site de l'association Sauvons le climat – qui peut se lire au fil de ses sections indépendantes.

PAR JEAN POITOU*

AVANT-PROPOS

Alors que le rôle de l'homme dans le réchauffement actuel du climat est reconnu de façon quasi unanime par la communauté des sciences du climat, il est des personnes qui mènent un combat sans relâche pour tenter de convaincre l'opinion et les décideurs qu'il n'en est rien. Certains, de parfaite bonne foi, doutent que l'homme agisse vraiment sur le climat; d'autres le proclament par intérêt : les actions nécessaires pour réduire le réchauffement ou s'y adapter vont à l'encontre de leurs intérêts.

Certains des arguments présentés par ceux qu'on appelle des climatosceptiques sont fondés sur des données biaisées ou des jeux de données excluant soigneusement ce qui pourrait contredire leur argumentation; d'autres se basent sur des calculs qui ne sont pas réalistes parce que leurs auteurs ont une vision trop simpliste des processus en jeu dans le système climatique. Face à cette polémique, notre but n'est pas de discuter une

par une les affirmations des uns ou des autres – cela nécessiterait un gros volume dont la lecture pourrait s'avérer ardue – mais de donner au lecteur des moyens d'exercer sa vigilance et son esprit critique vis-à-vis des arguments qui lui sont présentés, de voir dans quelle mesure les données pourraient éventuellement ne montrer que la partie de la réalité qui va dans le sens de celui qui l'énonce, d'identifier d'éventuelles failles dans les raisonnements présentés.

Après une introduction sur les mécanismes du climat, nous explicitons les règles de bon

usage de la Terre vers l'espace, une partie étant simplement la lumière solaire incidente réfléchie; le reste, sous forme de rayonnement infrarouge, est émis par la surface terrestre et par l'atmosphère. Les rayons

INTRODUCTION

La Terre reçoit l'essentiel de son énergie du Soleil : ce qui provient de l'intérieur du globe ne représente que 1/4 000 de ce qui arrive du Soleil. De l'énergie s'échappe

solaires qui ne repartent pas vers l'espace sont absorbés, leur énergie se retrouve sous forme de chaleur. De façon similaire, le rayonnement infrarouge émis par la Terre emporte de l'énergie. Quand la quantité d'énergie qui quitte la Terre diffère de la quantité d'énergie qui lui arrive, il y a, selon le signe de cet écart, refroidissement du globe s'il part plus d'énergie qu'il n'en arrive, et réchauffement dans le cas contraire. Ces variations de la température de la planète et de son atmosphère vont se poursuivre jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre entre énergie reçue et énergie émise soit atteint. Ainsi, tout ce qui modifie le bilan de l'énergie échangée avec l'espace induit une modification du climat.

La Terre étant sphérique, la surface de sol touchée par un rayon de soleil est d'autant plus grande que l'on s'éloigne de la zone équatoriale. La quantité de chaleur apportée par unité de surface décroît donc de l'équateur aux pôles. La machine climatique redistribue cette chaleur à la surface du globe, atténuant le contraste latitudinal. Cette redis-

Certains des arguments présentés par ceux qu'on appelle des climatosceptiques sont fondés sur des données biaisées ou des jeux de données excluant soigneusement ce qui pourrait contredire leur argumentation.

usage que sont censées respecter les présentations de données. Ensuite sont exposées quelques-unes des lacunes de représentations trop simplistes des processus climatiques qui conduisent à des conclusions

de la Terre vers l'espace, une partie étant simplement la lumière solaire incidente réfléchie; le reste, sous forme de rayonnement infrarouge, est émis par la surface terrestre et par l'atmosphère. Les rayons

tribution est portée par deux fluides : l'atmosphère qui enveloppe le globe et les océans. Le cycle de l'eau joue un rôle important dans cette redistribution du fait des caractéristiques de l'eau qui se trouve

El Niño peut accroître, pendant une durée de l'ordre d'un an, la température moyenne à la surface du globe de 0,1 à 0,2 °C. Du fait de la grande variabilité météorologique (le temps fluctue beaucoup d'un jour à l'autre,

Donner au lecteur des moyens d'exercer sa vigilance et son esprit critique vis-à-vis des arguments qui lui sont présentés.

dans notre environnement sous ses trois phases physiques : solide, liquide et vapeur. Le passage d'une phase à l'autre se fait avec une consommation importante de chaleur (fusion, vaporisation) ou une restitution des mêmes quantités de chaleur (gel, condensation).

Un déséquilibre du bilan énergétique du globe et le changement du climat qui en résulte peuvent être dus à une modification soit de l'intensité du rayonnement solaire incident pour lequel l'atmosphère est essentiellement transparente, soit de la réflectivité de la Terre pour ce rayonnement, soit encore de la transparence de l'atmosphère au rayonnement infrarouge.

Le climat peut aussi être affecté par des fluctuations internes au système climatique, liées au couplage entre les mouvements propres de l'atmosphère et les mouvements propres des océans. De telles fluctuations sont limitées à une région plus ou moins large du globe. L'étude des climats du dernier million d'années montre que le système climatique est parfois sujet à des phénomènes de bascule dans lesquels la température croît rapidement dans un hémisphère en même temps qu'elle décroît dans l'autre. Ce type de phénomènes est lié à des modifications de la circulation océanique. Ces fluctuations propres du climat ont cependant une incidence limitée en valeur et en temps sur la température moyenne globale. Ainsi, un fort

d'une année à l'autre), on se doit de considérer uniquement les tendances sur des périodes longues pour évaluer une évolution climatique ; typiquement, on considérera des périodes couvrant trois décennies.

Depuis la décennie 1970-1979, on constate un réchauffement de la température moyenne de

La machine climatique redistribue cette chaleur à la surface du globe, atténuant le contraste latitudinal. Cette redistribution est portée par deux fluides : l'atmosphère qui enveloppe le globe et les océans.

la surface du globe. Sur ce sujet circulent beaucoup d'informations, souvent contradictoires, dont le profane a du mal à apprécier le niveau de crédibilité. Dans ce qui suit, nous exposons certaines des caractéristiques qui font qu'une information est plausible ou qu'elle doit être considérée avec prudence, voire rejetée. Nous pointons également un certain nombre de théories qui sont incompatibles avec la physique du climat. Enfin, nous verrons dans quelle mesure ceux qui minimisent les impacts d'un réchauffement prennent en compte la réalité des choses.

QUELQUES RÈGLES DE BON USAGE DANS LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

Couverture temporelle

Du fait des fluctuations propres du climat et de la variabilité météorologique, il importe de considérer des périodes qui ne

soient pas trop courtes. Les observations météorologiques bien distribuées sur une grande partie du globe terrestre datent de 1880. Depuis les années 1970, on observe un réchauffement marqué. Au fil du temps, les mesures deviennent à la fois plus nombreuses et plus précises. Si un document montre une série de données qui ne couvre pas toute la période pour laquelle les données sont disponibles, il faut toujours se demander pourquoi. En effet, souvent, pour biaiser une présentation, des auteurs choisissent de n'utiliser qu'une série temporelle limitée, dans le dessein d'occulter la tendance qui serait ressortie s'ils avaient utilisé les données d'une période plus longue. Le choix d'une couverture temporelle limitée peut cependant être justifié si les données pré-

sentées sont extraites, sans les tronquer, d'une publication scientifique dont évidemment on aura donné la référence, et sous réserve que la publication citée n'ait pas été rectifiée par une publication plus récente.

Couverture spatiale

Un phénomène ne peut être qualifié de global que s'il affecte

courants marins... conditionnent la façon dont les évolutions se répartissent à la surface du globe. Des observations d'un même phénomène en divers points du globe ne permettront de faire qualifier ce phénomène de global que si elles sont concomitantes. L'observation par satellite, quand elle est possible, apporte une contribution précieuse pour apprécier le caractère global d'un phénomène.

Cependant, un phénomène peut présenter certains effets déroutants, voire contradictoires. Par exemple, l'affaiblissement du Gulf Stream dû au réchauffement global peut conduire à un refroidissement sur l'Atlantique Nord qui va contrebalancer localement la tendance générale. Ainsi, certaines anomalies locales dans l'évolution du climat global sont en fait des conséquences de cette évolution. Dans de tels cas, les causes de cette anomalie locale apparaissent physiquement liées à l'évolution globale par des processus connus.

Quelles données

Il faut une période longue pour définir une tendance climatique. Les conditions météorologiques sont très fluctuantes, le temps change beaucoup d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Si on porte sur un graphique la température moyenne globale mois après mois, la courbe obtenue est fluctuante (*grisé* sur la *figure 1*), avec des variations mensuelles qui sont

On se doit de considérer uniquement les tendances sur des périodes longues pour évaluer une évolution climatique ; typiquement, on considérera des périodes couvrant trois décennies.

de façon synchrone les diverses régions du globe. Toutefois, ce phénomène peut avoir une intensité très variable d'un lieu à un autre. En effet, la latitude, la position des continents, le relief, les régimes des vents, les

nettement supérieures aux variations interannuelles ou à la tendance. Pour réduire le bruit d'origine météorologique, on effectue des moyennes. La moyenne annuelle (*courbe bleue*) est encore assez chahutée. Pour ►

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

► cette raison, la plupart des auteurs travaillant dans les sciences du climat préfèrent une moyenne glissante sur 5 ans qui est beaucoup plus régulière (*courbe rouge*). Finalement si

des données filtrées des fluctuations rapides de la météorologie ou de celles dues au cycle du soleil. Évidemment, un modèle (contestataire, « climato-sceptique ») qui prétend reproduire

environnemental sur le climat. Il ne faut pas oublier que des corrélations ne sont jamais à elles seules une preuve de relation de cause à effet. On peut trouver de nombreux exemples

reporter à la source originelle pour en savoir plus sur les données, sur les incertitudes associées... Même si l'indication de la source n'est pas une garantie d'authenticité (la référence est parfois erronée, ou les données manipulées ou tronquées avant présentation), son absence doit toujours inciter à la prudence.

DES THÉORIES QUI IGNORENT LA PHYSIQUE DES PROCESSUS EN JEU

Certaines personnes, éventuellement de bonne foi, prétendent démontrer que l'homme n'est pas en cause dans l'évolution récente du climat. À cet effet, elles élaborent des théories et se livrent à des calculs qui leur semblent probants. Toutefois leur méconnaissance de phénomènes intervenant dans le fonctionnement du climat les conduit à élaborer des théories qui ne s'appliquent pas à la réalité de la machine climatique. Nous allons en donner quelques exemples.

L'atmosphère agissant comme une vitre

Un certain nombre de calculs reposent sur l'hypothèse implicite que l'atmosphère se comporte comme une feuille mince transparente à la lumière visible, comme une vitre. Le rayonnement thermique de la Terre vers l'espace est supposé émis par la surface terrestre. Si on suppose que la « vitre » est opaque pour ce type de rayonnement, celui-ci est absorbé et rien n'en part vers l'espace. Cette hypothèse est implicite dans les raisonnements qui affirment que, puisque tout étant




Figure 1. — En grisé, les moyennes mensuelles; en bleu les moyennes annuelles, en rouge les moyennes glissantes sur 5 ans; en noir les moyennes glissantes sur 11 ans. L'ordonnée correspond à l'écart par rapport à la moyenne des années 1961-1990. Source : HadCRUT4 (<https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/>).

on désire s'affranchir de la modulation due au cycle de l'activité solaire (11 ans), on utilisera la moyenne glissante sur 11 ans (*courbe noire*).

Les modèles climatiques doivent être capables de reproduire la nature chaotique de la physique du climat, et donc l'amplitude des variations mensuelles ou annuelles, mais ces variations n'ont bien sûr aucune raison d'être synchrones avec celles du climat réel. Ainsi, lorsqu'on compare les résultats de modélisations climatiques à des observations, il est nécessaire de laisser ces fluctuations chaotiques au moyen de moyennes temporelles appropriées, ou d'en tenir compte dans l'appréciation des différences.

La comparaison des observations aux résultats d'un modèle d'évolution du climat aura beaucoup plus de sens si elle se fait avec

les observations pourra assez aisément s'insérer dans la zone grisée de la figure alors qu'il ne s'approcherait que très médiocrement de la courbe noire.

Corrélations

Certains auteurs présentent des observations de corrélations entre un paramètre environnemental et un paramètre lié au climat ou aux conditions météorologiques comme une preuve de l'influence de ce paramètre

de coïncidences complètement fortuites. Voir par exemple l'article de Jean-Pierre Delahaye dans *Pour la Science* n° 481 de novembre 2017, dont quelques courbes sont reproduites dans la *figure 2*. Pour que la relation de cause à effet soit plausible, il faut qu'on puisse énoncer et justifier quantitativement le processus par lequel la cause supposée produirait précisément l'effet observé.

Origine des informations

Quand on montre des données, des figures, en science, il convient de citer ses sources. Cela permet au lecteur ou à l'éditeur de se



Figure 2. — Corrélation ne signifie pas relation de cause à effet. Les exemples de la figure (tous américains), en sont une bonne illustration.

pratiquement absorbé dans les premiers mètres de l'atmosphère, doubler la concentration de CO_2 ne peut pas augmenter significativement une absorption qui est déjà quasi-totale. La même hypothèse implicite sous-tend les argumentations selon lesquelles le CO_2 ne joue pratiquement aucun rôle puisque le rayonnement a déjà été arrêté par la vapeur d'eau, le principal gaz à effet de serre naturel, beaucoup plus abondant dans l'atmosphère que le CO_2 .

De tels raisonnements violent le principe de conservation de l'énergie. Ils ignorent une des lois d'émission du rayonnement infrarouge, la loi de Kirchhoff : tout corps susceptible d'absorber un rayonnement est lui-même émetteur de rayonnement aux mêmes longueurs d'onde. Ainsi, si le CO_2 ou la vapeur d'eau absorbent du rayonnement infrarouge, ces corps émettent aussi un rayonnement dans les mêmes longueurs d'onde. Le rayonnement qui quitte la Terre sera donc émis essentiellement par l'atmosphère et pas par la surface terrestre. Il quittera l'atmosphère lorsque la quantité de gaz absor-




Figure 3. – L'augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre fait augmenter la température. La figure a montre le système dans son état initial, où l'énergie sortante équilibre l'énergie entrante. La ligne oblique schématise le profil vertical de température de la troposphère, dont la pente est fixée par la thermodynamique. Si la concentration de gaz à effet de serre croît (figure b), les infrarouges qui peuvent quitter l'atmosphère n'emportent plus assez d'énergie. La température de l'atmosphère doit croître pour que le système atteigne un nouvel équilibre (figure c), et, la pente du profil vertical étant inchangée, la température croît simultanément au niveau de la surface. (Des explications détaillées peuvent être trouvées dans un article de Jean-Louis Dufresne et Jacques Treiner paru dans *la Météorologie* en février 2011.)

sera donc plus faible que celle apportée par le soleil. Il s'en suivra une accumulation de chaleur, et donc un réchauffement de l'atmosphère. Celui-

Il ne faut pas oublier que des corrélations ne sont jamais à elles seules une preuve de relation de cause à effet. On peut trouver de nombreux exemples de coïncidences complètement fortuites.

bant située au-dessus du point d'émission ne suffira plus à l'absorber. Quand la concentration de gaz à effet de serre croît, l'altitude à laquelle le rayonnement doit être émis pour quitter l'atmosphère va donc s'élever. Comme dans la troposphère la température décroît avec l'altitude, l'intensité du rayonnement émis à l'altitude qui permet de quitter l'atmosphère va décroître tant que le climat n'aura pas réagi, puisque l'intensité du rayonnement émis varie comme la puissance 4 de la température absolue. L'énergie emportée par le rayonnement

ci accroît le rayonnement émis et permet d'atteindre un nouvel état d'équilibre dans lequel l'énergie apportée par le rayonnement solaire entrant est compensée par un rayonnement infrarouge sortant accru du fait de l'augmentation de la température. Ceci est illustré sur la figure 3.

Le CO_2 se répartit uniformément dans l'atmosphère. À l'inverse, lorsque la température baisse, la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau sans que celle-ci se condense diminue fortement. De ce fait, la concen-

tration de vapeur d'eau dans l'air chute lorsqu'on s'élève. Si des concentrations de l'ordre du % sont possibles au voisinage de la surface du globe, elles sont nécessairement plus faibles à quelques kilomètres d'altitude, là où interviennent les processus radiatifs qui régissent le bilan radiatif de la Terre. Ainsi, la vapeur d'eau ne saurait empêcher le CO_2 de jouer le rôle majeur dans l'action de l'homme sur le climat..

CO_2 atmosphérique

En l'absence de perturbations apportées par l'homme, l'atmosphère échange des quan-

250 milliards de tonnes qui, chaque année, sont émises et absorbées dans les échanges entre l'atmosphère et les océans. Par ailleurs, environ 420 milliards de tonnes sont émises et absorbées par les continents (végétation). Ces deux bilans annuels globaux sont équilibrés : pour chaque molécule émise, il y en a une qui est absorbée.

Composition isotopique. Dans la nature, le carbone existe sous trois formes isotopiques différentes : le noyau de l'atome contient toujours 6 protons, mais pas le même nombre de

La faiblesse anormale des concentrations de carbone 14 et de carbone 13 dans l'atmosphère observée dans les années 1950 a permis de mettre en évidence l'origine fossile d'une partie du carbone atmosphérique.

tités considérables de CO_2 avec l'environnement à bilan total nul. Ce sont environ

neutrons. Le carbone naturel contient près de 99 % de carbone 12 (6 neutrons), 1 % de

■ LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

► carbone 13 (7 neutrons) et des traces infimes (10^{-12}) de carbone 14 (8 neutrons). Ce dernier est produit par des réactions nucléaires entre le rayonnement

séjour atmosphérique d'une molécule de CO_2 , certains concluent que l'homme ne peut contribuer significativement à l'augmentation de la concen-

Le bilan du carbone atmosphérique montre que son augmentation annuelle est de l'ordre de la moitié des émissions humaines.

cosmique et les atomes d'azote de l'atmosphère. Le carbone 14 est radioactif, avec une demi-vie de 5730 ans : au bout de 5730 ans, la moitié des atomes de carbone 14 redonne de l'azote 14. Le carbone des combustibles fossiles qui n'a pas interagi avec l'atmosphère depuis des centaines de millions d'années ne contient évidemment plus de carbone 14. De plus, ces combustibles sont pauvres en carbone 13 du fait de leur origine biologique (l'assimilation de carbone dans les réactions biologiques favorise le carbone 12, plus léger, et donc plus mobile). Les mesures isotopiques offrent donc un moyen de suivre l'effet de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz sur la composition du car-

bon de ce gaz dans l'atmosphère. Mais ce raisonnement ignore les échanges de carbone avec l'environnement et leur importance dans la concentration relative des différents iso-

Une concentration très faible n'est pas la preuve d'une action négligeable. Ainsi, dans notre organisme, les hormones qui y jouent un rôle essentiel pour notre bonne santé ont des concentrations 1 000 fois plus faibles que celle du CO_2 dans l'atmosphère.

topes du carbone. La dynamique qui régit le sort d'une molécule ne préjuge pas de celle qui décrit les grands ensembles. Par exemple, dans une enceinte fermée à température constante contenant de l'eau liquide et de la

atmosphère n'est donc certainement pas le bon paramètre pour déterminer le temps de vie du carbone qui s'y trouve : elle permet d'estimer le temps de résidence d'une molécule de CO_2 dans l'atmosphère, mais pas le temps caractéristique d'une perturbation globale de composition liée à des émissions anthropiques de CO_2 qui se cumulent au fil des ans.

Origine du carbone atmosphérique. Pour certains auteurs, le carbone qui s'accumule dans l'atmosphère serait émis par les océans à la suite du réchauffe-

ment marquant la sortie du Petit Âge glaciaire depuis le milieu du XIX^{e} siècle. Cette affirmation est contredite par les faits : la quantité de CO_2 dissous dans l'eau de mer augmente régulièrement, provoquant une acidification croissante (baisse du pH) des océans. Puisque le taux de CO_2 dissous augmente, c'est qu'il y a absorption et non émission par l'océan.

Des affirmations naïves

Concentration actuelle du CO_2 . Certains prétendent que la faible quantité de CO_2 présent dans l'atmosphère ne peut avoir d'impact sur le climat. Ce raisonnement, qui ne repose sur aucune théorie, ignore un certain nombre de réalités. D'abord, la quantité de CO_2 (0,04 %) n'est pas négligeable : si au lieu d'être mélangés, les différents gaz se séparaient et stratifiaient par densité, le CO_2 formerait autour du globe une couche de 3,20 m d'épaisseur. Ensuite, une concentration très faible n'est pas la preuve d'une action négligeable. Ainsi, dans notre organisme, les hormones qui y jouent un rôle essentiel pour notre bonne santé ont des concentrations 1 000 fois plus faibles que celle du CO_2 dans l'atmosphère.

Concentration passée du CO_2 . Dans le passé, la Terre a connu des concentrations de CO_2 bien plus élevées qu'actuellement sans que cela entraîne un réchauffement. Il faut toutefois préciser ce qu'on appelle *le passé* et ce qui s'est alors réellement produit. Le passé, cela peut être les années précédant les mesures précises du CO_2 atmosphérique, effectuées loin des sources de pollution, introduites par Keeling en 1958, mais cela peut aussi être les ères géologiques de la Terre.

Concernant les diverses mesures effectuées antérieurement à 1958, les résultats présentent

C'est précisément pour s'affranchir de ces perturbations fluctuantes liées aux activités humaines que Keeling a eu l'idée d'installer ses stations de mesure loin de celles-ci, dans une île au milieu du Pacifique.

Il faut avoir une bien singulière conception des compétences pour s'imaginer qu'on les conserve par des « études papier ».

bone de l'atmosphère. La faiblesse anormale des concentrations de carbone 14 et de carbone 13 dans l'atmosphère observée dans les années 1950 a permis de mettre en évidence l'origine fossile d'une partie du carbone atmosphérique.

Le suivi des compositions isotopiques permet d'estimer la durée moyenne du séjour d'une molécule de CO_2 dans l'atmosphère. On trouve qu'elle est faible : seulement de quelques années. La perturbation de la concentration de CO_2 dans notre atmosphère est estimée par les climatologues à plusieurs siècles. Arguant de la faible durée de

vapeur d'eau, les volumes et les masses d'eau et de vapeur restent constants alors que des molécules d'eau traversent sans cesse la surface, passant d'un milieu à l'autre. Pour en revenir au CO_2 , sur une année, les océans et la végétation échangent avec l'atmosphère au total plus de 10 fois ce que l'homme y injecte pendant cette période. Cela veut dire que du carbone ayant une certaine composition isotopique sera remplacé dans l'atmosphère par du carbone ayant une autre composition isotopique initialement stocké dans les océans ou les plantes. La composition isotopique du carbone de l'at-

mosphère n'est donc certainement pas le bon paramètre pour déterminer le temps de vie du carbone qui s'y trouve : elle permet d'estimer le temps de résidence d'une molécule de CO_2 dans l'atmosphère, mais pas le temps caractéristique d'une perturbation globale de composition liée à des émissions anthropiques de CO_2 qui se cumulent au fil des ans.

En outre, le bilan du carbone atmosphérique montre que son augmentation annuelle est de l'ordre de la moitié des émissions humaines. Celles-ci peuvent être déterminées avec une précision de l'ordre de 10 % puisqu'on sait quelles quantités de combustibles fossiles ont été

extraites puis brûlées. La moitié de nos émissions qui quittent l'atmosphère est absorbée par l'environnement (océans et sur-

des variations considérables en des temps très courts, des variations qui ne peuvent être représentatives de l'atmosphère ter-

reste dans son ensemble. En effet, il n'existe aucun processus qui puisse, à l'échelle globale, absorber suffisamment de CO₂ en des temps très courts pour faire passer de valeurs élevées d'une mesure aux valeurs faibles mesurées peu de temps après. En fait, dans ces cas-là les

température semble avoir précédé celui des variations de la concentration atmosphérique du CO₂. Si c'est le cas pour le déclenchement du refroidissement, dont les caractéristiques astronomiques de l'orbite de la Terre sont la cause, c'est faux au moins dans un certain nom-

nier est dû à une configuration orbitale spécifique de la Terre autour du Soleil, une situation qui se met en place sur des échelles de temps de milliers d'années, et non de dizaines d'années comme les variations que l'activité humaine actuelle est en train de créer. D'autres mentionnent des observations limitées géographiquement où un réchauffement régional était compensé globalement par un refroidissement d'autres régions.

Des données satellitales détournées. Les satellites sont très utilisés pour acquérir des données météorologiques et climatologiques, et suivre leur évolution. Les instruments embarqués sur satellites apportent des informations précieuses, en particulier parce qu'un instrument unique peut apporter une couverture quasi globale quotidienne. Plusieurs instruments sur un satellite donné permettent d'observer simultanément des paramètres variés. Cependant,

Le lien avec la température de surface n'est pas direct et peut varier dans le temps. D'autre part, l'étalonnage des instruments en vol n'est pas facile et est une source d'incertitude. Les climatosceptiques présentent ces indices de température sans mentionner les limitations, et surtout sans indiquer qu'elles ne sont pas directement représentatives de la température de surface, qui est pourtant le paramètre important puisque c'est à la surface, et pas à 5 km d'altitude, que nous vivons.

DES EXPERTS QUI N'EN SONT PAS

La controverse sur l'action de l'homme sur le climat provoquée par l'opposition aux conclusions du GIEC est rarement le fait de climatologues. Certes, on en trouve quelques-uns (John Christy, Judith Curry, Richard Lindzen) qui y participent. Mais quelle théorie n'a pas ses détracteurs au sein de la communauté de ses spécialistes? La théorie de l'évolution, la relativité, la mécanique quantique ont toutes eu leurs opposants, et il en reste toujours quelques-uns, bien que la relativité et la mécanique quantique soient à l'œuvre partout dans notre vie quotidienne (sans elles, nos ordinateurs ou le GPS ne fonctionneraient pas). Parmi les scientifiques, le gros de ceux qui contestent l'influence de l'homme d'aujourd'hui sur le climat se recrute dans d'autres disciplines. Ces scientifiques n'ont cependant qu'une connaissance très partielle des processus

Rappeler que l'activité du Soleil croît avec son âge (augmentation de 7 % par milliard d'années) et que, par conséquent, il y a quelques centaines de millions d'années il fallait une concentration de CO₂ beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui pour aboutir à la même température à la surface du globe.

mesures étaient effectuées à côté des laboratoires, de sorte qu'elles intégraient au moment de la mesure le CO₂ qui venait juste d'être émis localement par les usines, le chauffage ou la circulation. C'est précisément pour s'affranchir de ces perturbations fluctuantes liées aux activités humaines que Keeling a eu l'idée d'installer ses stations de mesure loin de celles-ci, dans une île au milieu du Pacifique.

En ce qui concerne les ères géologiques, les conditions générales étaient alors très différentes. Il suffit de rappeler que l'activité du Soleil croît avec son âge (augmentation de 7 % par milliard d'années) et que, par conséquent, il y a quelques centaines de millions d'années il fallait une concentration de CO₂ beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui pour aboutir à la même température à la surface du globe.

Émissions de CO₂ et variation du climat. Le climat de la Terre a connu des variations importantes. Pensons par exemple aux glaciations que la Terre a connues au cours des trois derniers millions d'années, et dont nous avons une connaissance assez précise pour les dernières centaines de milliers d'années grâce à l'analyse des carottes de glace extraites de l'Antarctique et du Groenland. Dans certains cas, le début des variations de

bre de cas pour le réchauffement. Néanmoins, certains déduisent des cas où le début du réchauffement aurait précédé le début de l'accroissement du CO₂ atmosphérique que ce n'est pas le CO₂ qui agit sur le climat mais l'inverse. Serait-il donc si extraordinaire que deux phénomènes ne puissent selon les circons-

La controverse sur l'action de l'homme sur le climat provoquée par l'opposition aux conclusions du GIEC est rarement le fait de climatologues.

tances servir de cause l'un à l'autre? Par exemple, un moteur électrique asynchrone engendrera un mouvement lorsqu'on l'alimente en courant mais pourra produire de l'énergie électrique si par une action extérieure on le force à tourner. Notons de plus que, si l'effet de serre n'est pas le processus qui déclenche les glaciations, la diminution de l'effet de serre due à la décroissance des concentrations atmosphériques de CO₂ et de vapeur d'eau a joué un rôle fondamental pour donner au refroidissement l'ampleur qu'on lui connaît.

Certains mentionnent des variations passées du climat où le CO₂ ne joue pas de rôle moteur, comme lors de l'optimum (période chaude) d'il y a 8 000 ans. Or on sait que ce der-

ils ont aussi leurs limites, que certains utilisateurs de leurs données ignorent ou feignent d'ignorer. Ces dernières années, les climatosceptiques ont mis en avant la température de l'atmosphère, qui est déduite de l'intensité du rayonnement, infrarouge et micro-onde, émis

Parmi les scientifiques, le gros de ceux qui contestent l'influence de l'homme d'aujourd'hui sur le climat se recrute dans d'autres disciplines. Ces scientifiques n'ont cependant qu'une connaissance très partielle des processus en jeu.


par le milieu observé. Une limitation majeure est que la température obtenue est représentative d'une couche d'atmosphère très épaisse et mal définie.

en jeu. On les retrouve ainsi parmi les défenseurs des thèses erronées mentionnées plus haut. Certains, pour crédibiliser leur point de vue, se présentent néan-

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

► moins comme des experts du climat : comme des experts du GIEC pour les rapports sur le climat que cette entité publie régulièrement.

Qui sont les experts du GIEC? L'élaboration des rapports du GIEC se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, des scientifiques choisis pour leur connaissance de la discipline, attestée par leur production scientifique dans des revues de référence, sont sélectionnés pour rédiger un rapport. Ils en rédigent une première version, laquelle est soumise à un panel aussi large que possible d'experts, qui feront toutes les remarques, commentaires, demandes de modifications qui leur semblent justifiées. À ce stade, n'importe quel scientifique peut se faire agréer comme expert et soumettre son point de vue. De là vient l'ambiguïté de la notion d'*expert* dont certains jouent pour confondre le public. Pour être expert, il suffit d'en faire explicitement la demande, en justifiant qu'on a des compétences scientifiques. Si la très grosse



LE CLIMAT : LA TERRE ET LES HOMMES

Un livre dont Jean Poitou est co-auteur avec Pascale Braconnot et Valérie Masson-Delmotte, EDP Sciences, collection « Une Introduction à... », Les Ulis, 2015.

Au cours de son histoire, notre planète a connu des conditions climatiques très diverses. Comment fonctionne la machine climatique? Qu'est-ce que le climat global? Pourquoi et comment a-t-il changé au cours des temps géologiques? Comment se situe le changement climatique en cours dans ce contexte géologique et historique? Le réchauffement en cours est marqué par des phases d'accélération et de ralentissement, et des amplitudes différentes selon les régions. Comment faire la part des facteurs naturels et des activités humaines dans ce réchauffement récent? À quels risques climatiques serons-nous amenés à faire face les prochaines décennies... et les prochains siècles?

avis d'expertise qui ont été validés. La seconde version est alors soumise à un nouveau panel d'experts qui peuvent avoir fait partie ou non du premier panel. Que peut-on alors penser de ceux qui, ayant relu un rapport et l'ayant seulement commenté, se présentent publiquement

voire bénéfiques, pour le globe et pour l'humanité. Nous allons donner quelques exemples.

Température

« Une augmentation de 3 °C, ce n'est finalement rien de plus que de retrouver à Lille le climat actuel de Marseille. Ce serait donc plutôt agréable. »

Ce genre d'affirmation plaisante est malheureusement tendancieuse pour trois raisons :

1. Le réchauffement n'est pas uniforme à la surface du globe. Les continents se réchauffent beaucoup plus que les océans, et le réchauffement est d'autant plus accentué qu'on est plus loin de l'équateur. C'est ce qui

n'est pas située au bord d'une mer qui tempère les effets des canicules.

3. La modification du climat ne se limite pas à un réchauffement moyen. Le régime des précipitations aussi est modifié. Et, surtout, les extrêmes (par exemple les fortes précipitations, l'intensité et la durée des canicules...) sont accentués. Or ce n'est pas tant l'état moyen que les extrêmes qui ont un impact fort sur nous.

Certains arguent que l'homme a déjà connu des réchauffements importants. Entre le maximum de la dernière glaciation, il y a 21 000 ans, et l'optimum d'il y a 8 000 ans, la tem-

Que peut-on penser de ceux qui, ayant relu un rapport et l'ayant seulement commenté, se présentent publiquement comme « experts auprès du GIEC »?

majorité des experts sont effectivement des experts du domaine, les scientifiques ayant leurs compétences dans des domaines extérieurs à celui des sciences du climat sont également acceptés comme experts. Il est en effet apparu judicieux de disposer d'un éventail aussi large que possible incluant des regards extérieurs au domaine pour garantir la pertinence des rapports. Les auteurs du rapport ont alors l'obligation d'étudier toutes les remarques qui leur sont faites, quelle que soit leur origine. Si elles ne leur semblent pas pertinentes, ils doivent expliciter pourquoi ils choisissent de ne pas les prendre en compte. Le projet de rapport est alors modifié pour tenir compte des

comme « experts auprès du GIEC »? Juste qu'ils utilisent un label rendu facilement accessible par la communauté elle-même pour jouer sur les termes et faire accroire que cela garantit qu'ils ont des compétences en climatologie?

LES CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT

Indépendamment des questions concernant le climat, on assiste aussi à des controverses sur les impacts du changement climatique, pour l'homme et pour l'environnement. Dans ce cas, ce ne sont pas nécessairement le réchauffement ni le fait qu'il soit dû à l'homme qui sont niés. Par contre, les conséquences sont présentées comme négligeables,

Le réchauffement n'est pas uniforme à la surface du globe. Les continents se réchauffent beaucoup plus que les océans, et le réchauffement est d'autant plus accentué qu'on est plus loin de l'équateur. Un réchauffement terrestre moyen de 3 °C, c'est au moins un réchauffement de 5 °C à Lille.

est déjà observé actuellement. Un réchauffement terrestre moyen de 3 °C, c'est au moins un réchauffement de 5 °C à Lille. 2. L'environnement géographique de Lille est très différent de celui de Marseille. La ville

pérature moyenne globale avait augmenté de 6 °C. Selon eux, cela s'est fait sans conséquences catastrophiques pour l'humanité. Cette affirmation est difficilement vérifiable, mais prenons-la pour vraie. Nous devons

noter que l'augmentation de la température a été 10 fois plus lente que celle que nous induisons actuellement et que la Terre ne comptait que quelques millions d'habitants, et non des milliards comme aujourd'hui. Les ajustements individuel et collectif aux modifications de l'environnement pouvaient être effectués posément, et sans les problèmes conflictuels majeurs que risquent d'engendrer les déplacements massifs de population.

Finalement, n'oublions pas qu'il n'est pas exclu que des changements climatiques aient été la cause de l'extinction de certaines civilisations.

Le Grand Nord va souffrir particulièrement du réchauffement : toutes les infrastructures s'appuient sur un sol gelé, et donc rigide, dont la fonte va complètement faire disparaître la cohésion. Dès à présent, on constate des effondrements d'infrastructures et d'habitations.

Niveau de la mer

En se réchauffant, l'eau des mers se dilate. Mécaniquement, cela fait monter leur niveau. En outre, le réchauffement provoque des fontes massives de glaciers, tant continentaux qu'alpins. Cela ajoute de l'eau aux océans et participe à l'élévation du niveau marin.

Beaucoup pensent qu'une montée du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres en un siècle c'est peu de chose : il serait « facile » de s'en protéger avec des digues comme le montre l'exemple des Pays-Bas, dont de grandes métropoles côtières (Rotterdam, Amsterdam) sont situées plusieurs mètres au-dessous du niveau de la mer. Cependant, ceux qui disent cela paraissent ignorer que la mer n'est pas une grande bassine d'eau calme : le système océanique mondial est soumis aux vents et aux tempêtes ; il est le siège de courants marins ; sa température n'est pas partout la même. Il s'ensuit que le niveau de la mer présente de fortes




Figure 4. – Le niveau de la mer ne monte pas de façon uniforme. Certaines régions, telles que les États insulaires du Pacifique, subissent une élévation 10 fois plus rapide que d'autres régions.

variations selon le lieu. Ces variations vont se trouver amplifiées par le réchauffement climatique qui va aussi altérer les courants

(température, pluviosité) qui leur sont favorables. Quand les conditions locales changent, les espèces qui le peuvent

méconnaissent du sujet qui est à l'origine de leurs arguments. La réfutation de la plupart des arguments nécessite souvent des connaissances sur le fonctionnement du climat que n'a pas le profane et des développements dont le volume aurait nuï à la lisibilité de cet article. Pour les questions sur le réchauffement climatique l'Institut Pierre-Simon-Laplace a créé un site (<https://www.ipsl.fr/Pour-tous/Le-climat-en-questions>) où le lecteur trouvera des réponses accessibles au non-spécialiste. Le fonctionnement du climat est détaillé dans un livre accessible sans connaissances mathématiques (il ne contient aucune formule mathématique) abondamment illustré : *le Climat : la Terre et les hommes* de Jean Poitou, Pascale Braconnot et Valérie Masson-Delmotte (EDP Sciences). Il est aussi disponible en version électronique. ■

*JEAN POITOU est climatologue et président du conseil scientifique de l'association Sauvons le climat (www.sauvonsleclimat.org).

Si certaines régions seront peu affectées par une montée moyenne du niveau de la mer de 40 à 50 cm (la valeur actuellement prévue d'ici à la fin du xx^e siècle), d'autres le seront beaucoup.

marins. Ainsi, comme le montre la *figure 4*, on observe déjà une grande disparité géographique dans la montée du niveau de la mer. Si certaines régions seront peu affectées par une montée moyenne de 40 à 50 cm (la valeur actuellement prévue d'ici à la fin du *xxi^e* siècle), d'autres le seront beaucoup.

D'autre part, si construire et entretenir une digue est à la portée d'un État développé et peu étendu comme les Pays-Bas, il en sera tout autrement pour les pays plus pauvres qui ont justement une part de plus en plus importante de leur population qui vit dans leur bande côtière.

Biodiversité

Les espèces animales et végétales prospèrent chacune dans les conditions environnementales

migrent pour retrouver des conditions favorables, les autres disparaissent. La plupart des animaux peuvent en principe migrer tant qu'ils ne rencontrent pas un obstacle naturel (mer, montagne) ou artificiel (voies de circulation, urbanisation) qui le leur interdit. Il leur reste ensuite à dénicher des écosystèmes qui leur conviennent. Il n'en est pas de même de la végétation, particulièrement les arbres, qui ont un cycle végétatif long qui ne leur permet pas de suivre la rapidité d'un changement climatique qui s'accélère.

CONCLUSION

Comme exposé dans l'avant-propos, nous ne présentons ni ne discutons les arguments des climatocéptiques, sauf dans des cas où c'est clairement une

ÉCRIVEZ-NOUS À
progressistes@pcf.fr